14

Monsieur N.° ~~48~~ 43.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

jl ÿ Deux ans, que je gueri un ulcere fistuleux au Sternum, par un traitement Singulier; Ce n'est point pour Concourir aux prix De L'academie, que je'd honneur de vous Ecrire; Cette Cure ma plû dans le tems; Et je Suis Bien aize de vous En faire part

un jeune homme, agé de 18 ans, apres une fievre quarte, D'un an; Et une toux des plus Cruëles. Eut un Depot à la partie Superieure du Cartilage xiphoïde, un peu a Droite; jl persa De lui même; la personne qui le voyoit, j fit mêtre de l'onguent, Et le purgea de temps En tems.

je vis le malade Deux mois aprés l'ouverture de l'abces; jl avoit une fievre lente, Et les jours qu'il Devoit avoir la fievre quarte jl ÿ avoit Des frissons ~~tous~~ le Soirs, toux presque Continuelle; Des Crachats Epais Et abondans, devoiement, hidropisie generale; jl vomissoit Souvent par la violence de la toux; le pus qui Sortoit de l'ulcere Etoit puant, Gris, Et aboudant.

à Deux pouces Et Demi de l'ulcere du coté Du Sternum, je decouvris un Enfoncement, De la largeur D'un liard. j'en fis l'ouverture, Et ausi grande que je peux; je m'assuré

ARC 41 n° 80

de la Communication des deux ouvertures, je mis de la Charpie a celle que j'avois pratiqué, Et un lardon d'Eponge preparée à l'aiguille, afin de la dilater davantage.

Le Lendemain, je passé une pince à anneau par la premiere ouverture; je pris un Stilet d'algalie, je formé un petit anneau au Bout, je Cousus à cett anneau une Bande de parchemin, Bien jmbibée de Beaume de fioraventi Spiritueux; je le passé par l'ouverture Superieure de Sesis avec les pinces, Et l'amené au dehors; alors je detaché la Bande de parchemin, qui me Servit de Seton; Et je reconduisis le Stilet avec les pinces jusqu'à l'endroit ou je l'avois pris. La meche ordinaire ne pouvoit pas me Servir, Elle se seroit accrochée aux jnegalites des os qui Etoit Cariés. jndependament de Cest Espece de Seton, on fesoit à Chaque pensement des jnjections, avec une decoction d'orge, dans laquelle on fesoit jnfuser de l'hipericum, Et on j'ajoutoit de la teinture de Mirrhe; toute l'injection Sortoit par l'ouverture jnferieure; le malade fut pensé trois fois par jour; Et à Chaque pensement on apliquoit à Chaque ouverture un petit Cataplasme Composé avec la petites joubarbe Bien pilée, que je melez avec autant d'huille de Laurier.

j'etablis un regime un peu nourrissant, mais donné peu à la fois; je lui fis faire usage de

L'opiate suivant, matin et soir, a la doze d'un gros.

Beaume de Lucatel 2 onces

Blanc de Baleinne une once

gomme ammoniac, antimoine diaphoretique,

yeux d'ecrevice, sang de bouquetin, de chacun

deux gros

incorporez le tout avec S. q. de sirop d'opium de la pharmacie de Beaumé, par dessus chaque prise de cet opiat on donnoit une tasse d'une infusion de pied de chat, et de sassafras, avec du sucre; le malade a pris cette opiate et cette infusion pendant trois mois; et le dernier mois il ne les prenoit qu'une fois par jour. il etoit purgé tous les huit ou dix jours avec la manne le sirop violat, dans une legere decoction de quinquina; et quatres fois la semaine on lui donnoit un lavement composé de centaurée et de quinquina.

au bout d'un mois l'ulcere ne fournit plus le quart du pus qu'il fournissoit précédament, et le pus etoit bien conditionné; la fievre et tous les autres simptomes disparurent, vers le meme tems; il n'i eut que la toux qui dura jusqu'au 45 ou 50e jour, et l'ulcere finit de suppurer vers le 70e. depuis ce tems la le malade se porte bien.

il y a 10 ou 12 ans que j'eux un pareil ulcere à traiter je fis des injections; et j'employé les remedes usités en pareil cas, sans pouvoir parvenir a deterger l'ulcere, au lieu que ce second traitement tout singulier, il

(qui est)

Marcuse. Dans les Campagnes ces ulceres sont assés communs, la negligence et la pauvreté peuvent en être la cause, et il menoit toujours a la mort. ne seroit il pas possible d pratiquer une contre ouverture, je vous le laisse a decider. je vous avoüe que si j'avois une pareille operation a faire, je serois fort embarassé. je ne pense pas qu'il y eut communication d cet ulcere avec l'interieur d la poitrine, quoique tous les simptomes annonsoit une phthisie au moins commensente. je ne vous donne pas Monsieur la description d ces parties, vous la connoissés mieux que moi, je vous fairis seulement observer, que le mediastin se porte lateralement a gauche, a l'endroit ou le sternum se joint avec le cartilage des cotes, la cavité droite d la poitrine, doit avoir plus d'etendue que la gauche, je crois donc que l'ulcere etoit entre la plevre, les cotes, et le sternum, et que les filamens que le seton et les injections entrenoit, etoit le tissu cellulaire d la face externe d la plevre, et des parties des environs. j'ai l'honneur d'etre avec tout le respect possible.

Monsieur

Votre humble et tres obeissant serviteur

[illegible] Chirurgien

a primontré ce 16 mars 1787